



貝殼世界裡的 「馬」

文.圖/ 阿德蝸 (陳文德)



▲圖1. 斑馬峨螺 SH 16.0mm。



▲圖2. 小斑馬峨螺 SH 9.5mm。



▲圖3. 細小斑馬峨螺 SH 7.0mm。



▲圖4. 正斑馬峨螺 SH 10.2mm。



▲圖5. 斑馬法螺 SH 33.2mm。



▲圖6. 斑馬極螺 SH 33.0mm。



▲圖7. 斑馬渦螺 SH 40.0mm。



▲圖8. 大焰筆螺 SH 20.0mm。

在馬年的第一個月裡，筆者不免俗的要來介紹在貝殼的世界裡，有哪些種類的名字跟「馬」有關。

馬的品種不少，但在所有的「馬」當中，應該是以身上條紋清楚的「斑馬」最具特色，也最為人們所熟悉。因此，若有貝類殼的花紋是條紋狀的話，就有被命以「斑馬」名的可能。

在台灣產的峨螺科 *Buccinidae* 貝類當中，就有四種「斑馬」，它們分別是斑馬峨螺 *Puslostoma mendicaria* (圖1)、小斑馬峨螺 *Enzinopsis lineate* (圖2)、細小斑馬峨螺 *Enzinopsis zepa* (圖3) 和正斑馬峨螺 *Enzinopsis zonalis* (圖4)。

這四種峨螺都屬於小型的貝殼，其中斑馬峨螺是恆春半島礁岩潮間帶常見的種類，同時也是殼表條紋最為明顯，有規則，體型也最大的一個。正斑馬峨螺在體型上則次之，且其白色殼表上的紅褐色斑則較不規則。

小斑馬峨螺的黑褐色螺肋較斑馬峨螺細，至於，細小斑馬峨螺則是四種當中體型最小的種類，在外觀上較近似小斑馬峨螺，不過，細小斑馬峨螺的黑褐色螺肋不連續，且呈結瘤狀突起。



▲圖9. 線條東洋蝸牛 SH 7.0mm。






除了上述四種外，中文名有斑馬的還有法螺科 Ranellidae 的斑馬翼法螺 *Gyrineum gyrinum* (圖5)、榧螺科 Olividae 的斑馬榧螺 *Oliva rufula* (圖6) 和渦螺科 Volutidae 的斑馬渦螺 *Amoria zebra* (圖7)。這三種貝殼不管是縱向還是橫向，同樣有著「條理分明」的斑紋，都屬於特徵明顯，容易鑑定的種類。

此外，斑馬渦螺的種名 *zebra*，正也是斑馬的意思，想必當年的命名者 Leach，就是以斑馬渦螺殼表上規則的縱向條紋為其命名依據。另外，種名有 *zebra* 的貝類還有斑馬鶯蛤 *Pteria zebra*、斑馬寶螺 *Cypraea zebra*、小焰筆螺 *Strigatella zebra* (圖8)。其中，小焰筆螺也是恆春半島潮間帶就可見到的種類。不過，可惜的是，*Strigatella zebra* (小焰筆螺) 是 *Strigatella paupercula* (大焰筆螺) 的同種異名，是無效的學名。

至於，台灣產的蝸牛當中，線條東洋蝸牛 *Pilosphaera zebra* (圖9) 是唯一和「斑馬」有關的種類。線條東洋蝸牛的殼小型，且很薄，為稻黃色，殼表有紅褐色閃電狀紋，殼皮發達，長有淡黃色的殼毛，是山蝸牛科 Cyclophoridae 裡蠻特別的種類。

除了「斑馬」之外，「馬蹄」也會被用來命名，如：鐘螺科 Trochidae 馬蹄鐘螺 *Tectus niloticus maximus* (圖10)，馬蹄鐘螺約呈三角圓錐狀，殼表有紅白色相間的斜紋，是本文裡體型最大的種類，因其外觀像「馬蹄」一般，所以有馬蹄鐘螺之名。厚重的馬蹄鐘螺因其殼底平坦，過去曾是製作鈕扣的材料之一。

蜆科 Corbiculidae 的紅樹蜆 *Geloina erosa* (圖11) 有著發達的殼皮，且殼皮具光澤。殼色從黃褐色、黃綠色到黑褐色都有，殼皮顏色會有所不同，一般來說是與其棲息環境有關。紅樹蜆目前在雲林沿海一帶有人工養殖，漁民因其殼的形狀而另稱之為馬蹄蛤。



▲圖10. 馬蹄鐘螺 SH 105.0mm。

【作者：陳文德 屏東市民生國小教師】



▲圖11. 紅樹蜆(馬蹄蛤) SW 91.2mm。

